AVERTISSEMENTS



PRATIQUES AGRICOLES FREDEC

Ministère de l'Agriculture Service Régional de la Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue 518, rue St Fuscien BP 69 80092 AMIENS CEDEX 3 Tél: 03.22.33.55.97 Fax: 03.22.33.55.56 E-mail: srpv.drafpicardie@agriculture.gouv.fr Notre site: www.srpvpicardie.com

est soun

(C), SPV Toute reproduction même partielle

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles d'AMIENS Directeur gérant : Christophe MARTINET Publication périodique C.P.P.A.P nº1823AD ISSN n°07576609

Tarif Courrier 55 € Tarif Fax 55 € Tarif E-mail 55 €

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 17 du 5 août 2002 - 01 pages

Phénologie

Stade: Grossissement des tubercules. Le défanage se poursuit sur les variétés de consommation.

Mildiou

Le coin des modèles

La réserve de spore est élevée sur un grande partie de la région. En revanche, sur certains postes, Aisne et sud de la région, les taches maintenant anciennes constituent une réserve modérée. Cependant, nombreuses furent les contaminations ces jours derniers. Les sorties de taches imminentes vont remonter le potentiel. Les averses annoncées en ce début de semaine conduiront à de nouvelles contaminations. Le potentiel de sporulation devrait être fort à nouveau sur la majorité des postes, dans les prochains jours, notamment à partir du 9 dans la zone sud.

Strution épidénida ja eposte por poste

(danis antz Divax)

Postes dimutiques Génération Contaminations

Sène

11ène

Dène

Dène

11ène

Dène

11ène

Sense.

12ène

9ène

8ène

Phetedrique

12ène

Amiens (Boxes)

Attily

Bouleau

Forté

Freichent

Ind

Maraelaave

St Just

Vauillers

Verdily

Vicsur Asme

Villeroy

Willers Boonge

Date der.

34/8

31/7et 1,34/8 àportir du7

31/7et 1, 3-4/8 aportin du 7

31/7et 34/8 àpartir du7

31/7et 1,34/8 àportir du 7

26/7aul/8, 34/8 àportir du 31

30-31/7et 3-4/8 aportir du 6

3031/7et34/8 aportinou6

30-31/7et3-4/8 àportir du 6

31/7et 1,34/8 àportir du 7

31/7et 3-4/8 aportindu7

3031/7et34/8 àpartir du6

30-31/7et3-4/8 apartir du 6

Date prévue

toche

10-11/8

moven

moven

moyen

fat

fart

fart

fart

moyen

moven

Par conséquent, il n'est pas envisageable de décaler le renouvellement du traitement pour les variétés intermédiaires et sensibles.

Préconisations pour les parcelles que l'on veut maintenir en végétation

TOUTES VARIETES

Poursuivez un renouvellement à 7 jours avec un dithiocarbamate à 1600 g de

En ces périodes pluvieuses, un produit plus résistant au lessivage sera bien adapté.

Préconisations pour les parcelles où la date de défanage est proche

TOUTES VARIETES

Dans le cas où des symptômes de mildiou ont été observés, préférez l'emploi des produits type fluazinam (SHIRLAN) ou cyazofamide (RANMAN). Ces produits permettent de minimiser les attaques de mildiou sur tubercules. Un renouvellement à 7 jours est conseillé.

Dans le cas contraire, maintenez une protection avec un mancozèbe.

Le défanage

Le défanage permet d'optimiser la récolte aux de sortie de Retentiel de débouchés (calibres, matière sèche). spoulation Le défanant n'est pas un fongicide, il est important de poursuivre la protection antimoven mildiou jusqu'à dessiccation complète du moven feuillage et des tiges

	le
Volumes de bouillie	F
250 Vha	i
Ω043ΩΟΙ /ν α	I

Mildiou Les périodes pluvieuses entretiennent es risques.

> Pucerons Aucune ntervention ne se justifie

Rappel sur le défanage

-	and the same of the same of			LUMBE
	BASTAFI	Conscrimution	4Vra	
	150g/1 deglufasirate annonium	Féalle	au 2×251/haá3 jarsdinterdle	250 Uha
_	REBLONE2 200g/lobdquat	Plant	3×21/ma33 jarsdintervalle	
		Consonnation	25à351/ha au 2x251à3 jarsdinhandle	20043001/16
		Féalle	3à51/haselon ledegréde sérescence	
	SPOTLIGHTRUS COg/1 confenirozone éthyle	Plant	2 possogsså 20 Mrade RELLONE å 3 jours d'intervalle suivis de 1 à 2 SPOILIE-ITRUS à 1 Mra	3001/hg
		Consommation	1 litre/ha5 jarsaprès le posage dun BASTAF1 audun REGLONE2	

Prévisions climatiques

A l'exception des journées de jeudi et vendredi qui devraient être plus ensoleillées, Météo France annonce des averses ces prochains jours. Retour d'un passage pluvio-orageux pour le week-end prochain.

Appui à l'interprétation du modèle Le potentiel de sporulation redevient élevé. SPOTLIGHT PLUS, homologué en Avril 2002 Défanant de contact qui agit sur la photosynthèse, le détachement des tubercules des tiges principales, et limite les repousses sur tiges.